

Υγρό Λίπασμα Αζώτου - Χαλκού

AMINA-Cu

2 - 0 - 0 + 5Cu

ΣΥΝΘΕΣΗ	(% β/β)	(% β/ο)
Αζωτο (N)	2,30	2,85
Οργανικό-N	2,30	2,85
Χαλκός (Cu)	5,00	6,25
Αμινοξέα	14,00	17,50
pH		5,6-5,9
Αγωγιμότητα (mS/cm)		30,2
Αλατότητα (ppt)		18,2



Περιεχόμενο

1 lt

5 lt

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971

E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το **AMINA-Cu** είναι κατάλληλο για λαχανικά, κηπευτικά (υπαίθρια και θερμοκηπίου), φράουλα, σπρωροφόρα, εσπεριδοειδή, αμπέλια, καλλωπιστικά φυτά (θάμνοι, δέντρα), δημητριακά, βαμβάκι, καλαμπόκι κ.α. Συστήνεται για διαφυλλικούς ψεκασμούς και εφαρμογές από εδάφους μέσω του συστήματος λίπανσης-άρδευσης στις ακόλουθες δοσολογίες:

Διαφυλλικός ψεκασμός: 50-200 ml ανά 100 λίτρα νερό

Υδρολίπανση: 0,5-1,0 lt/στρέμμα

Υδροπονία: 0,5-1,0 lt/500 λίτρα νερό

Σημείωση: Στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας ενδείκνυται εφαρμογή με την ελάχιστη δοσολογία.

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ο αριθμός των εφαρμογών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την εμφάνιση και ένταση των παρουσιαζόμενων τροφοπενιών χαλκού. Οι εφαρμογές ξεκινούν όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα τροφοπενίας και συνεχίζονται μέχρι την εξάλειψή τους.

Το **AMINA-Cu** μπορεί επιπλέον να εφαρμοστεί και για βελτίωση του σφρίγγου των φυτών και ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους ενάντια στο στρες από περιβαλλοντικούς και βιολογικούς παράγοντες. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές ξεκινούν από την έναρξη της περιόδου ανάπτυξης και συνεχίζονται με επαναλαμβανόμενες εφαρμογές κάθε 15-30 ημέρες έως τη συγκομιδή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να εφαρμόζεται τις δροσερές ώρες της ημέρας. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες προκαλούμενο από υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους κλπ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα λιπάσματα και χημικά παρασκευάσματα. Να μην συνδυάζεται με σκευάσματα που περιέχουν ωφέλιμους μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες). Όλες οι υδατοδιαλυτές σκόνες να αναμιγνύονται με το **AMINA-Cu** μετά από προδιάλυση. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το **AMINA-Cu**. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

Το **AMINA-Cu** είναι ένα υγρό λίπασμα το οποίο προσφέρει οργανικό άζωτο, αμινοξέα, πεπτιδία, ένζυμα και χαλκό σε χηλική μορφή. Λόγω της σύνθεσής του το **AMINA-Cu** απορροφάται εύκολα από τους ιστούς των φύλλων και διεισδύει στο εσωτερικό του φυτού επιτυγχάνοντας τη γρήγορη διόρθωση τροφοπενιών χαλκού και αζώτου και τη διέγερση των κυτταρικών λειτουργιών. Παράλληλα λόγω της υψηλής συγκέντρωσης χαλκού αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΧΡΗΣΕΙΣ

Το **AMINA-Cu** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες προσφέροντας τα ακόλουθα οφέλη:

- * Διορθώνει γρήγορα και αποτελεσματικά τις τροφοπενίες χαλκού και αζώτου
- * Διεγείρει την ανάπτυξη του φυτού.
- * Συνδράμει στη βελτίωση των κυτταρικών λειτουργιών στο εσωτερικό του φυτού.
- * Ενισχύει το σφρίγγος και την ανθεκτικότητα των φυτών σε ποικίλους περιβαλλοντικούς και βιολογικούς παράγοντες.
- * Βοηθά στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των φυτών.
- * Βελτώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκομιδής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγωνιά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από κατοικίδια ζώα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Είναι επιβλαβές εάν καταποθεί. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια γιατί προκαλεί ερεθισμό και πιθανή βλάβη. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια. Χρησιμοποιήστε ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, φόρμα, γάντια, γυαλιά κτλ.) κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: B'
Αρ. κυκλοφορίας: