

Λίπασμα Αζώτου-Βορίου σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης

Dia-B

bio
Κατάλληλο
για βιολογικές
καλλιέργειες

Για τη διόρθωση τροφονειών Βορίου
σε όλες τις καλλιέργειες

3 - 0 - 0+17B

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Η εφαρμογή του **Dia-B** στις καλλιέργειες επιτυγχάνει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 - Πλήρη κάλυψη των αναγκών των φυτών σε βόριο και ταχεία εξάλειψη εμφανιζόμενων τροφονειών βορίου.
 - Αύξηση του άμεσα διαθέσιμου στα φυτά αζώτου στα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξής τους.
 - Αύξηση της καρποδετικής ικανότητας των φυτών.
 - Επιτάχυνση των βιοχημικών διεργασιών που συντελούνται μέσα στα φυτά (σχηματισμός σακχάρων, φωτοσύνθεση).
 - Υψηλή απορροφητικότητα βορίου λόγω των αμινοξέων που περιέχονται στο προϊόν.
 - Μεγαλύτερη προσληπτικότητα βορίου από το φύλλωμα εξαιτίας των προσκολλητικών ιδιοτήτων του σκευάσματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Προστατέψτε το από την παγωνιά. Να μην εφαρμόζετε όταν το φως του ήλιου είναι έντονο και η θερμοκρασία μεγαλύτερη από 24°C.

ΑΝΑΜΙΞΗ

Συστήνεται προδιάλυση του προϊόντος πριν την ανάμιξη στο στη δεξαμενή εφαρμογής. Εναλλακτικά προτείνεται η σταδιακή διάλυση του προϊόντος στο βυτίο με διαρκή ανάδευση για ευκολότερη μεταχείριση και αποφυγή συσσωματώσεων. Να εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατό μετά τη διάλυση.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και υγρά λίπασματα. Όλες οι υδατοδιαλυτές σκόνες να αναμιγνύονται με το **Dia-B** μετά από προδιάλυση. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Είναι επιβλαβές εάν καταπιείναι. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια γιατί προκαλεί ερεθισμό και πιθανή βλάβη. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια. Χρησιμοποιήστε ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, φόρμα, γάντια κτλ.) κατά την εφαρμογή του προϊόντος. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά την εφαρμογή.

ΣΥΝΘΕΣΗ	(% β/β)
Βόριο (B)	17,0
Αζωτο (N)	3,0
Οργανικό N	3,0
Αμινοξέα	18,8
pH	8,26
Αγωγιμότητα (mS/cm)	16,4
Αλατότητα (ppt)	9,6

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Το **Dia-B** είναι κατάλληλο για εφαρμογές από εδάφους μέσα από συστήματα άρδευσης-λίπανσης καθώς και με διαφυλλικού ψεκασμούς. Η ποσότητα εφαρμογής καθορίζεται από την ένταση της τροφονείας βορίου, το είδος της καλλιέργειας, το μέγεθός της και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Εδαφική Εφαρμογή:

- Εφαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες βορίου της καλλιέργειας ως ακολούθως:
 - α) Μεγάλη ανάγκη βορίου: 0,5-1,5 κιλό/στρέμμα
 - β) Μέτρια ανάγκη βορίου: 250-500 γρ./στρέμμα
 - γ) Μικρή ανάγκη βορίου: 100-250 γρ./στρέμμα

Διαφυλλική Εφαρμογή:

Εφαρμόζουμε όταν η καλλιέργεια έχει αναπτύξει αρκετό φύλλωμα ώστε να μπορεί να απορροφήσει το στρέψι. Όταν είναι εφικτό, πρέπει να χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς πολλές από τις ευαίσθητες καλλιέργειες έχουν κηρώδη φύλλα που είναι δύσκολο να διαβρεχθούν.

Τεύτλα: 600 γρ./στρέμμα σε τουλάχιστον 50 λίτρα νερό/στρέμμα.

Λαχανικά: 600 γρ./στρέμμα σε τουλάχιστον 50 λίτρα νερό/στρέμμα.

Ελιά: 600 γρ./στρέμμα σε 100 λίτρα νερό/στρέμμα.

Μήλα: 3 εφαρμογές σε διαστήματα 14-21 ημερών ή μία από την άλλη με δόσολογία 250 γρ./στρέμμα σε τουλάχιστον 100 λίτρα νερό/στρέμμα.

Γενικά, μια δόσολογία 600 γρ./στρέμμα είναι ικανοποιητική για τις περισσότερες καλλιέργειες που παρουσιάζουν τροφονεία βορίου. Όταν η τροφονεία είναι έντονη, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως το 1,25 κιλό/στρέμμα. Μην εφαρμόζετε ποτέ περισσότερο από 1,25 κιλό/στρέμμα με μία μόνο εφαρμογή. Εάν η καλλιέργεια χρειάζεται περισσότερο από 1,25 κιλό/στρέμμα διαιρέστε τη συνολική ποσότητα σε 2-3 δόσεις εφαρμόζοντας κάθε 14 μέρες.

Δελτοειδές δευτερογενές παρθένο στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Τοξικό για την αναπαραγωγή (κατ. 1B)

Δηλώσεις Κινδύνου:

H360FD : Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Προληπτικές Δηλώσεις:

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.

1 kg 5 kg 25 kg

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

Ομάδα Λιπασμάτων νέου τύπου: Β' Αρ. κυκλοφορίας: