

- Τεχνικό Δελτίο -**DIA-B**

Το **Dia-B** είναι ένα λίπασμα Αζώτου-Βορίου που χρησιμοποιείται για τη διόρθωση τροφοπενιών αζώτου και βορίου σε όλες τις καλλιέργειες. Όλο το άζωτο που περιέχεται στο προϊόν είναι οργανικό και προέρχεται από τα αμινοξέα που υπάρχουν σε υψηλό ποσοστό μέσα στο σκεύασμα. Το **Dia-B** βρίσκεται σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης και απορροφάται εύκολα και γρήγορα τόσο από τα φύλλα όσο και από τις ρίζες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Πλήρη κάλυψη των αναγκών των φυτών σε βόριο και ταχεία εξάλειψη εμφανιζόμενων τροφοπενιών βορίου.
- Αύξηση του άμεσα διαθέσιμου στα φυτά αζώτου στα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξής τους.
- Αύξηση της καρποδετικής ικανότητας των φυτών.
- Επιτάχυνση των βιοχημικών διεργασιών που συντελούνται μέσα στα φυτά (σχηματισμός σακχάρων, φωτοσύνθεση).
- Υψηλή απορροφητικότητα βορίου λόγω των αμινοξέων που περιέχονται στο προϊόν.
- Μεγαλύτερη προσληπτικότητα βορίου από το φύλλωμα εξαιτίας των προσκολλητικών ιδιοτήτων του σκευάσματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εφαρμόζεται κύρια με πότισμα μέσω του συστήματος άρδευσης/λίπανσης και με διαφυλλικούς ψεκασμούς σύμφωνα με τις ακόλουθες δοσολογίες.

Δοσολογίες Εφαρμογής: Γενικά εφαρμόζεται στην ακόλουθη δοσολογία.

Εφαρμογή με υδρολίπανση: Εφαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες βορίου της καλλιέργειας ως ακολούθως:

α) Μεγάλη ανάγκη βορίου: 0,5-1,5 κιλό/ στρέμμα

β) Μέτρια ανάγκη βορίου: 250-500 γρ./ στρέμμα

γ) Μικρή ανάγκη βορίου: 100-250 γρ./ στρέμμα

Διαφυλλική Εφαρμογή: 600 γρ./στρέμμα σε 50-100 λίτρα νερό/στρέμμα

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ**(β/β)**

Άζωτο (N)	3,00 %
Οργανικό Άζωτο	3,00 %
Βόριο	17,00 %

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Εμφάνιση: Λεπτή σκόνη χρώματος ώχρας
Πυκνότητα: 1,028gr/ml σε διάλυμα 10%

Διαλυτότητα: 100% διαλυτό στο νερό
pH: 8,26 σε διάλυμα 10%