

Το **BIOFERTIN-L 7-0-0** είναι ένα υγρό οργανικό λίπασμα που παρασκευάζεται από την ήπια ενζυματική υδρόλυση φυσικών πρωτεϊνών (κολлагόνου). Αυτή η παραγωγική διαδικασία εγγυάται τη διατήρηση των απαραίτητων αμινοξέων καθώς και ένα υψηλό ποσοστό οργανικού αζώτου (>7%) προερχόμενου μόνο από τα αμινοξέα.

#### ΧΡΗΣΕΙΣ

- Το **BIOFERTIN-L 7-0-0** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες ως:
- ✓ Οργανικό λίπασμα αζώτου για διαφυλλικούς ψεκασμούς, υδρολιπτάσεις και υδροτονικά συστήματα.
  - ✓ Προσκολητικό/διαβρέχτης καθώς έχει υψηλό ιξώδες με αποτέλεσμα να κολλά στα φύλλα.
  - ✓ Βιοδιεγέρτης ανάκαμξης μετά από περιόδους έντονου στρες από βιοτικούς και κλιματικούς παράγοντες λόγω του υψηλού ποσοστού αμινοξέων που περιέχει.
  - ✓ Διεγέρτης βελτίωσης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.
  - ✓ Χηλικοποιητικός παράγοντας ιχνοστοιχείων (Fe, Zn, Mn, Cu) καθώς τα αμινοξέα βελτιώνουν την απορρόφηση των μεταλλικών μικροστοιχείων από τα φυτά.

#### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αυξάνει την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών.
- Παρέχει άζωτο άμεσα διαθέσιμο στα φυτά.
- Ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών στο στρες.
- Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των χημικών λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
- Επιταχύνει τις βιοχημικές διεργασίες που συντελούνται μέσα στο φυτό (φωτοσύνθεση, σχηματισμός σακχάρων).
- Προάγει την ανάπτυξη των καρπών.

#### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα λιπάσματα και χημικά παρασκευάσματα. Όλες οι υδατοδιαλυτές σκόνες να αναμινώνονται με το **BIOFERTIN-L 7-0-0** μετά από προδιάλυση. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το **BIOFERTIN-L 7-0-0**. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

#### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Είναι επιβλαβές εάν καταπίνετε. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια γιατί προκαλεί ερεθισμό και πιθανή βλάβη. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια. Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, φόρμα, γάντια κτλ.) κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

**ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

# Biofertin-L

7 - 0 - 0



#### ΥΓΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

για διαφυλλικούς ψεκασμούς και υδρολιπτάσεις σε όλες τις καλλιέργειες

ΣΥΝΘΕΣΗ	(% β/β)	(% β/ο)
Άζωτο (N)	7,0	8,0
Αμινοξέα	43,0	50,0
Χλώριο (Cl)	< 1,0	< 1,2
pH		5,5-6,5
Αγωγιμότητα (ds/m)		9,5
Αλατότητα (ppt)		5,5



Φιλικό στο περιβάλλον

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Β' Αρ. κυκλοφορίας:

**HUMOFERT**

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση  
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971  
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

#### Περιεχόμενο

- 1lt
- 5 lt
- 12 lt
- 25 lt
- 200 lt
- 1000 lt

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το **BIOFERTIN-L 7-0-0** μπορεί να εφαρμοστεί με διαφυλλικό ψεκασμό ή πότισμα μέσω του συστήματος άρδευσης/λίπανσης σύμφωνα με τις ακόλουθες δοσολογίες.

**Διαφυλλικός ψεκασμός:** 500-700 ml/στρέμμα αραιωμένο σε 50-200 λίτρα νερό

**Υδρολίπανση:** 1-3,5 lt/στρέμμα

**Υδροτονία:** 1-2,5 lt/500 λίτρα νερό

**Προσκολητική δράση:** 300-500 ml/100 λίτρα νερό

#### ΑΡΙΘΜΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

**Φράουλες:** Κάθε 10-15 ημέρες από την έναρξη της ανάπτυξης έως τη συγκομιδή.

**Καρποδετικά λαχανικά (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύθι, κ.α.):** Κάθε 8-12 ημέρες από τη μεταφύτευση έως τα μέσα της συγκομιδής.

**Φυλλώδη λαχανικά:** Κάθε 7-10 ημέρες αρχίζοντας από την εμφάνιση των πρώτων πραγματικών φύλλων.

**Κηπευτικά (καρπούζι, πεπόνι, κ.α.):** Κάθε 7-12 ημέρες ξεκινώντας μετά τη μεταφύτευση έως την πλήρη ανάπτυξη των καρπών.

**Πατάτα:** Κάθε 10-14 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο σχηματισμού του κονδύλου έως την έναρξη της άνθησης.

**Καρότο, Κρεμμύδι, Παντζάρι:** Κάθε 10-15 ημέρες ξεκινώντας από τη 2η-3η εβδομάδα μετά την ανόδωση και έως τη μεγέθυνση της ρίζας.

**Δέντρα (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιές, κ.α.):** Κάθε 10-15 ημέρες ξεκινώντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως την αρχή της ωρίμανσης.

**Αμπέλι, Ακτινίδιο:** Κάθε 10-15 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως την αρχή της ωρίμανσης.

**Καλλωπιστικά φυτά, Δασικά δενδρύλλια:** Κάθε 7-12 ημέρες από τη μεταφύτευση και μετά.

**Λουλούδια:** Κάθε 8-12 ημέρες από τη μεταφύτευση έως το μέγιστο της συγκομιδής.

**Γκαόν, Αστικό πράσινο:** Κάθε 10-15 ημέρες.

**Δημητριακά:** Στο στάδιο των 10-20 εκατοστών.

**Χορτονομίς:** Κάθε 8-12 ημέρες αρχίζοντας νωρίς την άνοιξη και επαναλαμβάνοντας μετά από κάθε κόψιμο.

**Βαμβάκι:** Στην αρχή της άνθησης και 7-12 ημέρες αργότερα.

**Καλαμπόκι:** Στο στάδιο των 15-20 εκατοστών, στο στάδιο των 25-35 εκατοστών και πριν το σχηματισμό του θύσανου.

#### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρήστε το προϊόν καλά κλεισμένο στον περιέκτη. Το προϊόν δε θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μεταλλικά δοχεία. Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου ή σε δροσερό μέρος.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ

Να εφαρμόζεται τη δροσερότερη της ημέρας.