

Το **BIOFERTIN-L 2-0,5-4** είναι ένα υγρό εδαφοβελτιωτικό σκευάσμα που παρασκευάζεται αποκλειστικά από φυσικές οργανικές πρώτες ύλες. Περιέχει οργανικό άζωτο προερχόμενο από την ήπια ενζυματική υδρόλυση πρωτεϊνών καθώς και φώσφορο, κάλιο, ασβέστιο (0,6% β/β) και μαγνήσιο (0,1% β/β) από φυτικά εκχυλίσματα. Η μεγάλη περιεκτικότητά του σε οργανική ουσία (>54%) αλλά και το υψηλό ποσοστό αμινοξέων και ολιγοσακχαριτών που περιέχει προσδίδουν στο **BIOFERTIN-L 2-0,5-4** εξαιρετικές ιδιότητες βελτίωσης της γονιμότητας των καλλιεργούμενων εδαφών.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Το **BIOFERTIN-L 2-0,5-4** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες ως:
- ☑ Υγρός ενεργοποιητής εδάφους.
 - ☑ Βιοδιεγέρτης ανάκαμψης των φυτών σε περιόδους έντονης καταπόνησης από περιβαλλοντικά αίτια (παγωνιά, καύσωνα).
 - ☑ Βιοδιεγέρτης βελτίωσης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.
 - ☑ Χηλικοποιητικός παράγοντας για τα θρεπτικά στοιχεία του εδάφους.
 - ☑ Συμπλήρωμα θρέψης για τα φυτά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αυξάνει την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών.
- Βελτιώνει τις φυσιολογικές ιδιότητες του εδάφους.
- Ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών στο στρες.
- Βελτιώνει την αφομοίωση των χημικών λιπασμάτων από τα φυτά.
- Αυξάνει την οργανική ουσία του εδάφους.
- Προάγει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.
- Αυξάνει τον πληθυσμό των ωφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους.
- Παρέχει άζωτο και κάλιο άμεσα διαθέσιμα στα φυτά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα λιπάσματα και χημικά παρασκευάσματα. Όλες οι υδατοδιαλυτές σκόνες να αναμινώνονται με το **BIOFERTIN-L 2-0,5-4** μετά από προδιάλυση. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Είναι επιβλαβές εάν καταπίνεται. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια γιατί προκαλεί ερεθισμό και πιθανή βλάβη. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια. Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, φόρμα, γάντια κτλ.) κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Biofertin-L

2 - 0,5 - 4

ΥΓΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ

για εδαφικές εφαρμογές σε
όλες τις καλλιέργειες

ΣΥΝΘΕΣΗ	(% β/β)	(% β/α)
Άζωτο (N)	2,0	2,6
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	0,5	0,7
Κάλιο (K ₂ O)	4,0	5,2
Αμινοξέα	11,5	15,7
Σακχαρίτες	37,0	50,0
Οργανική ουσία	54,0	73,7
pH		6,0-6,5



bio
Κατάλληλο
για βιολογικές
καλλιέργειες

Περιεχόμενο

- 1lt
- 5 lt
- 12 lt
- 25 lt
- 200 lt
- 1000 lt

HUMOFERT

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το **BIOFERTIN-L 2-0,5-4** εφαρμόζεται στο έδαφος μέσω του συστήματος άρδευσης/λίπανσης (υδρολίπανση) ή με ψεκασμό γύρω από την περιοχή των ριζών στις ακόλουθες δοσολογίες:

Καλλιέργειες θερμοκηπίου (αγγούρι, τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, πεπόνι, κολοκύθι): 1-2 ml ανά φυτό (Εφαρμογές: Κάθε 7-15 ημέρες από τη μεταφύτευση έως τα μέσα της συγκομιδής)
Υπαίθρια κηπευτικά (τομάτα, πιπεριά, κολοκύθι, μελιτζάνα, καρπούζι, πεπόνι): 1-2 ml ανά φυτό (Εφαρμογές: Κάθε 7-15 ημέρες ξεκινώντας μετά τη μεταφύτευση έως τα μέσα της συγκομιδής)
Λάχανο, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μαρούλι, Αντιό, Σπαράγγι: 1 ml ανά φυτό (Εφαρμογές: Κάθε 7-10 ημέρες αρχίζοντας από την εμφάνιση των πρώτων πραγματικών φύλλων)
Φράουλα: 2-3 ml ανά φυτό (Εφαρμογές: Κάθε 10-15 ημέρες από την έναρξη της ανάπτυξης έως τη συγκομιδή)
Πατάτα: 1-2 ml ανά φυτό (Εφαρμογές: Κάθε 10-14 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο σχηματισμού του κουδούλου έως τη συγκομιδή)
Καρότο, Κρεμμύδι, Παντζάρι, Τεύτλα: 1-2 ml ανά φυτό (Εφαρμογές: Κάθε 10-15 ημέρες ξεκινώντας από τη 2η-3η εβδομάδα μετά την ανάδυση και έως τη μεγέθυνση της ρίζας)
Μαϊντανός, Σέλινο, Άνηθος: 2 lt ανά στρέμμα κάθε 15-20 ημέρες
Καπνός: 1-2 ml ανά φυτό (Εφαρμογές: Κάθε 10-14 ημέρες αρχίζοντας 10 ημέρες μετά τη μεταφύτευση)
Βαμβάκι: 1 ml ανά φυτό (Εφαρμογές: Μετά τα 4 πραγματικά φύλλα - Μετά το δέσιμο του καρυδίου)
Καλλωπιστικά φυτά: 1-2 ml ανά φυτό κάθε 7-15 ημέρες
Θάμνοι: 3-4 ml ανά θάμνο κάθε 7-15 ημέρες
Γκάζον, Χλοοτάπητες: 300 ml ανά 100 τ.μ. κάθε 15-20 ημέρες
Αμπέλι: 2-3 lt ανά στρέμμα (Εφαρμογές: Κάθε 10-15 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως τη συγκομιδή)
Εσπεριδοειδή, Ακτινίδιο: 2-3 lt ανά στρέμμα (Εφαρμογές: Κάθε 10-15 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως τη συγκομιδή)
Μήλα, Αχλάδια, Σύκα: 2-3 lt ανά στρέμμα (Εφαρμογές: Κάθε 10-15 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως τη συγκομιδή)
Βερικοκα, Ροδάκινα, Κεράσια, Δαμάσκηνα, άλλα πυρηνόκαρπα: 2-3 lt ανά στρέμμα (Εφαρμογές: Κάθε 10-15 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως τη συγκομιδή)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διατηρήστε το προϊόν καλά κλεισμένο στον περιέκτη. Το προϊόν δε θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μεταλλικά δοχεία. Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου ή σε δροσερό μέρος.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ