

ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Fe EDDHA

Ειδικό για τροφοπενίες σιδήρου σε όλες τις καλλιέργειες και όλους τους τύπους εδαφών.

Ferrum

Ε ν ε ρ γ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά

Fe EDDHA 6 %

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT 

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου
Τ.Κ. 144 52, Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891
Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr
Web Site: www.humofert.gr

Καθ. βάρος : 1 Kg 25 Kg



Το **Ferrum** χρησιμοποιείται για τη θεραπεία τροφοπενιών σιδήρου σε όλες τις καλλιέργειες. Λόγω του χηλικού του παράγοντα (EDDHA), συστήνεται για όλους τους τύπους εδαφών και ειδικά για αλκαλικά και ασβεστούχα εδάφη.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται κύρια από το έδαφος. Διαλύουμε σε κατάλληλη ποσότητα νερού και κάνουμε ριζοπότισμα είτε μέσω συστήματος σταγόνων είτε ψεκάζοντας με χαμηλή πίεση γύρω από τη ρίζα. Σε πολύ συμπαγή εδάφη ή δέντρα με βαθύ ριζικό σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί μέσω εγχυτήρα. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί ως αδιάλυτη σκόνη μέσα σε κυκλικό αυλάκι που έχουμε ανοίξει γύρω από την ρίζα του φυτού. Στη συνέχεια σκεπάζουμε και ποτίζουμε καλά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενσωμάτωση με το επιφανειακό έδαφος το αργότερο μέσα σε 1-2 ώρες μετά την εφαρμογή. Η ενσωμάτωση μπορεί να γίνει με σκάλισμα ή καλό πότισμα. Σημείωση : Δεν συστήνεται η εφαρμογή του από το φύλλωμα διότι το προϊόν είναι ευαίσθητο στο φως, ενώ μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε φυτά με πλούσιο φύλλωμα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζουμε μέγιστη εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα χλωρώσεως και επαναλαμβάνουμε κάθε 2-3 εβδομάδες μέχρι την εξάλειψή της. Προληπτικά, εφαρμόζουμε στην αρχή της περιόδου βλάστησης για δέντρα και θάμνους ή πριν τη σπορά ή τη φύτευση για τις εμπορικές καλλιέργειες.

ΣΥΝΔΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μπορεί να αναμιχθεί με όλα σχεδόν τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και παρασιτοκτόνα. Ένα τεστ συνδιαστικότητας συστήνεται πάντα πριν την ανάμιξη.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Οι δοσολογίες θα πρέπει να υπολογίζονται ανάλογα με το μέγεθος του δέντρου ή του φυτού, την ηλικία του, τον τύπο του εδάφους και το βαθμό της έλλειψης σιδήρου.

Μηλιές, Βερικοκίες, Ροδακινιές, Αχλαδιές, Δαμασκηνιές : 25-125 γρ./δέντρο, ανάλογα με το μέγεθός του.

Εσπεριδοειδή : Για νεαρά δέντρα 500-750 γρ./100m². Για μεγάλα δέντρα 200-500 γρ./ δέντρο. Σε επίσης πρόγραμμα συντήρησης εφαρμόστε 50-150 γρ./δέντρο.

Αμπέλι : 10-50 γρ. ανά πρέμνο ή 750-1500 γρ. ανά 100m σειράς.
Βαμβάκι, Μπιζέλια, Φασόλια, Σιτηρά, Λαχανικά, Πιπεριές, Τεύτλα, Πατάτες, Τομάτες, Πεπόνια, Κολοκύθια : 250-550 γρ./στρέμμα ακριβώς πριν τη σπορά ή τη φύτευση ή στην αρχή της εμφάνισης χλωρώσεων.

Φρούλευρα, Βατόμουρα : 750-1500 γρ./100 μέτρα σειράς.

Ροδόδεντρα, Αζαλέες, Τριανταφυλλιές, Φορσυθιές : 20-50 γρ./φυτό

Χρυσάνθεμα, Γεράνια, και άλλα παρόμοια ετήσια και πολυετή φυτά : 10-60 γρ./10m².

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά την εφαρμογή. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος, μακριά από έντονο φως. Να μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες, όπως υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους κλπ. Να αποφεύγεται η κατάποση και η επαφή με τα μάτια και το δέρμα.