

Χηλικός Σίδηρος σε υδατοδιαλυτή σκόνη

Για τη διόρθωση της τροφοπενίας Σιδήρου σε όλες τις καλλιέργειες

Elem-Fe

Χηλικός
Παράγοντας
EDTA

Περιέχει
13,2%
Σίδηρο



Καθ. βάρος

1 Kg

5 Kg

25 Kg

Λίπασμα Ε.Κ.

Το Elem-Fe χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της τροφοπενίας σιδήρου σε όλες τις καλλιέργειες. Περιέχει 13,2% Σίδηρο σε χηλική μορφή (χηλικός παράγοντας EDTA) και συστήνεται κύρια για διαφυλλικές εφαρμογές.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κάνουμε προδιάλυση στο νερό σε αναλογία 1:6 (ένα μέρος σκόνης σε έξι μέρη νερού). Ανακατεύουμε καλά έως ότου η σκόνη διαλυθεί πλήρως. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε το διάλυμα στο νερό που θα χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή. Όταν χρησιμοποιείται διαφυλλικά μόνο του (χωρίς ανάμιξη με άλλα φυτοφάρμακα) συστήνεται η πρόσθεση στο διάλυμα προσκολλητικού.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, οι διαφυλλικές εφαρμογές θα πρέπει να αρχίζουν στην αρχή της περιόδου, όταν υπάρχει αρκετό φύλλωμα για να απορροφήσει το στρέι.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μπορεί να αναμιχθεί με όλα σχεδόν τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και παρασιτοκτόνα. Επίσης είναι συμβατό με τα υπόλοιπα ιχνοστοιχεία Elem καθώς και με διαλύματα που περιέχουν φώσφορο, όπως υγρά διαφυλλικά λιπάσματα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστήνεται πάντα πριν την ανάμιξη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971

E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Οι δοσολογίες θα πρέπει να υπολογίζονται ανάλογα με το μέγεθος του φυτού και το βαθμό της έλλειψης σιδήρου.

Υπαιθριες καλλιέργειες : 100 - 200 γρ. σε 30-100 κιλά νερό/στρέμμα. Σε περιπτώσεις έντονης τροφοπενίας σιδήρου εφαρμόζουμε πάλι μετά από 2 εβδομάδες.

Καλλιέργειες οπωρικών : 100 - 200 γρ./στρέμμα σε πρόγραμμα επαναλαμβανόμενων ενισχυμένων ψεκασμών π.χ. 4 εφαρμογές των 50γρ. σε 100 κιλά νερό/στρέμμα.

Σημείωση : Οι δοσολογίες δεν πρέπει να ξεπερνούν ποτέ το 1 γρ./2 κιλά νερό.

Καλλιέργειες θερμοκηπίου (Τομάτες, Αγγούρια, Κολοκύθια κτλ., Άνηθ, Καλλωπιστικά φυτά) :

Διαφυλλικά : 50 γρ./1000 κιλά νερό.

Ριζοπότισμα : 100 γρ./1000 κιλά νερό.

Υδροπονικά συστήματα : 80 γρ./1000 κιλά νερό θρεπτικού διαλύματος, αφού πρώτα ρυθμίσουμε το pH του θρεπτικού διαλύματος στο 6. Εάν τα συμπύματα παραμένουν, επαναλάβετε τη θεραπεία 10-14 ημέρες αργότερα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά την εφαρμογή. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος, μακριά από έντονο φως. Να μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες, όπως υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους κλπ. Να αποφεύγεται η κατάποση και η επαφή με τα μάτια και το δέρμα.