

# Βόριο σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης

Για τη διόρθωση της τροφοπενίας Βορίου σε όλες τις καλλιέργειες

# Elem-B

Περιέχει  
21%  
Βόριο



## Καθ. βάρος

1 Kg

5 Kg

20 Kg

Λίπασμα Ε.Κ.

Το **Elem-B** χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της τροφοπενίας Βορίου σε όλες τις καλλιέργειες. Περιέχει 21% Β σε μορφή Βορικού Νατρίου (67,8%  $B_2O_3$ , 14,6%  $Na_2O$ ) και συστήνεται για διαφυλλικές και εδαφικές εφαρμογές.

### ΑΝΑΜΙΞΗ

Προετοιμάστε ένα συμπυκνωμένο διάλυμα Βορίου και προσθέστε το στη δεξαμενή. Ανακατέψτε καλά και εφαρμόστε το μίγμα το συντομότερο δυνατό.

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

**Εδαφική Εφαρμογή:** Εφαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες Βορίου της καλλιέργειας.

**α) Μεγάλη ανάγκη Βορίου** (Τεύτλα, Μπρόκολο, Κουνουπίδι, Λάχανο, Σέλινο, Μηδική, Τριφύλλι, Ηλιοτρόπιο, Αμύγδαλο, Βερίκοκο, Δαμάσκηνο, Μήλο, Καρύδι, Ελιά, Αμπέλι): 0,5-1,2 κιλά/στρέμμα

**β) Μέτρια ανάγκη Βορίου** (Τομάτα, Μελιτζάνα, Κολοκύθι, Μαρούλι, Σπανάκι, Καρότο, Κρεμμύδι, Γλυκό Καλαμπόκι, Βαμβάκι, Καπνός, Σπαράγγι, Αχλάδι, Ροδάκινο, Κεράσι): 250-500 γρ./στρέμμα

**γ) Μικρή ανάγκη Βορίου** (Πατάτα, Πιπεριά, Πεπόνι, Μπιζέλι, Φράουλα, Εσπεριδοειδή, Καλαμπόκι, Δημητριακά, Γκαζόν, Σόγια, Σόργο): 100-200 γρ./στρέμμα

**Διαφυλλική Εφαρμογή:** Εφαρμόζουμε όταν η καλλιέργεια έχει αναπτύξει αρκετό φύλλωμα ώστε να μπορεί να απορροφήσει το σπρέι. Όπου είναι εφικτό, πρέπει να χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς πολλές από τις ευαίσθητες καλλιέργειες έχουν κηρώδη φύλλα που είναι δύσκολο να διαβρεχτούν.

**Τεύτλα:** 250- 500 γρ./50 λίτρα νερό ανά στρέμμα.

**Λαχανικά:** 100-500 γρ./200-500 λίτρα νερό.

**Ελιά:** 500 γρ./500 λίτρα νερό.

**Μήλα:** Κάνουμε 3 εφαρμογές σε διαστήματα 14-21 ημερών η μία από την άλλη με δοσολογία 200 γρ./80-100 λίτρα νερό ανά στρέμμα.

**Σημείωση:** Μην εφαρμόζετε ποτέ περισσότερο από 1 κιλό ανά στρέμμα με μία μόνο εφαρμογή. Εάν η καλλιέργεια χρειάζεται περισσότερο από 1 κιλό ανά στρέμμα διαιρέστε τη δοσολογία σε περισσότερες δόσεις και εφαρμόστε πολλές φορές ανά χρονικά διαστήματα 14 ημερών μεταξύ των εφαρμογών.

### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με τα περισσότερα μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και υγρά λίπασματα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας είναι καλό να γίνεται πάντοτε πριν την ανάμιξη στη δεξαμενή.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά την εφαρμογή. Προστατέψτε το από την παγωνιά. Να μην εφαρμόζετε όταν το φως του ήλιου είναι έντονο και η θερμοκρασία μεγαλύτερη από 24°C. Να αποφεύγεται η κατάποση και η επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

### ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Τοξικό για την αναπαραγωγή (κατ. 1B)

### Δηλώσεις Κινδύνων :

H360FD : Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

### Προληπτικές Δηλώσεις :

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

P308+P313: Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευτείτε/επισκεφτείτε γιατρό.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

**HUMOFERT**



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση

Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971

E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr