

ΧΗΛΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ Fe EDDHA

Ειδικό για τροφοπενίες σιδήρου σε όλες τις καλλιέργειες και όλους τους τύπους εδαφών.

FERILION



Ενεργά Συστατικά : Fe EDDHA 6 %

Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. βάρος : 1 Kg 3 Kg 15 Kg

Το FERILION χρησιμοποιείται για τη θεραπεία τροφοπενιών σιδήρου σε όλες τις καλλιέργειες. Λόγω του χηλικού του παράγοντα (EDDHA), συστήνεται για όλους τους τύπους εδαφών και ειδικά για αλκαλικά και ασβεστούχα εδάφη.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται κύρια από το έδαφος. Διαλύουμε σε κατάλληλη ποσότητα νερού και κάνουμε ριζοπότισμα είτε μέσω συστήματος σταγόνων είτε ψεκάζοντας με χαμηλή πίεση γύρω από τη ρίζα. Σε πολύ συμπαγή εδάφη ή δέντρα με βαθύ ριζικό σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί μέσω εγχυτήρα. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί ως αδιάλυτη σκόνη μέσα σε κυκλικό αυλάκι που έχουμε ανοίξει γύρω από την ρίζα του φυτού. Στη συνέχεια σκεπάζουμε και ποτίζουμε καλά. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ενσωμάτωση με το επιφανειακό έδαφος το αργότερο μέσα σε 1-2 ώρες μετά την εφαρμογή. Η ενσωμάτωση μπορεί να γίνει με σκάλισμα ή καλό πότισμα.

Σημείωση : Δεν συστήνεται η εφαρμογή του από το φύλλωμα διότι το προϊόν είναι ευαίσθητο στο φως, ενώ μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε φυτά με πλούσιο φύλλωμα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζουμε μόλις εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα χλώρωσης και επαναλαμβάνουμε κάθε 2-3 εβδομάδες μέχρι την εξάλειψή της. Προληπτικά, εφαρμόζουμε στην αρχή της περιόδου βλάστησης για δέντρα και θάμνους ή πριν τη σπορά ή τη φύτευση για τις εποχιακές καλλιέργειες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971

E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Οι δΟΣΟΛΟΓΙΕΣ θα πρέπει να υπολογίζονται ανάλογα με το μέγεθος του δέντρου ή του φυτού, την ηλικία του, τον τύπο του εδάφους και το βαθμό της έλλειψης σιδήρου.

Μηλίες, Βερικοκίες, Ροδακινίες, Αχλαδιές, Δαμασκηνίες : 25-125 γρ./δέντρο, ανάλογα με το μέγεθός του (Νεαρά δέντρα: 25-75γρ./δέντρο - Μεγάλα δέντρα: 60-125γρ./δέντρο)

Εσπεριδοειδή : Για νεαρά δέντρα 25-100 γρ./δέντρο. Για μεγάλα δέντρα 80-200 γρ./δέντρο. Σε ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης εφαρμόστε 50-150 γρ./δέντρο.

Αμπέλι : 10-50 γρ. ανά πρέμνο ή 750-1500 γρ. ανά 100m σειράς.

Βαμβάκι, Μπιζέλια, Φασόλια, Σιτηρά, Λαχανικά, Πιπεριές, Τεύτλα, Πατάτες, Τομάτες, Πεπόνια, Κολοκύθια : 250-550 γρ./στρέμμα ακριβώς πριν τη σπορά ή τη φύτευση ή στην αρχή της εμφάνισης χλωρώσεων.

Φράουλες, Βατόμουρα : 750-1500 γρ./100 μέτρα σειράς.

Ροδόδεντρα, Αζαλέες, Τριανταφυλλίες, Φορσυθίες : 20-50 γρ. (2-5 κουταλιές γλυκού)/φυτό. Διαλύουμε σε 5-10 λίτρα νερό και ποτίζουμε γύρω από τη ρίζα.

Χρυσάνθεμα, Γεράνια, και άλλα παρόμοια ετήσια και πολυετή φυτά : 10-60 γρ./10m². Εναλλακτικά ριζοπότισμα με αναλογία 30-50 γρ. (3-5 κουταλιές γλυκού) ανά 10 λίτρα νερό.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μπορεί να αναμιχθεί με όλα σχεδόν τα εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και παρασιτοκτόνα. Ένα τεστ συνδυαστικότητας συστήνεται πάντα πριν την ανάμιξη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά την εφαρμογή. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος, μακριά από έντονο φως. Να μην εφαρμόζετε σε καλλιέργειες που υποφέρουν από στρες, όπως υπερβολικές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους κλπ. Να αποφεύγεται η κατάποση και η επαφή με τα μάτια και το δέρμα.