


ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ ΡΙΖΑΣ



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: ΣΤ'
Αρ. κυκλοφορίας: 24

RIZOCYN

NPK 0.6 - 1 - 3

Φυσικός βιοδιεγέρτης για γρήγορη ανάπτυξη πλούσιου και υγιούς ριζικού συστήματος σε καλλιεργούμενα φυτά στο θερμοκήπιο και στην ύπαιθρο

ΣΥΝΘΕΣΗ

- παράγοντες (Κυτοκινίνες, Αυξίνες, Γιβζερελίνες)
▪Βιταμίνες (συμπεριλαμβανομένης της C και της Ριβοφλαβίνης-B2)
▪Αμινοξέα και πεπτίδια (προϊόντα υδρολύσης)
▪Υδατάνθρακες (Μονοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες)
▪Χουμικά και φουλβικά οξέα
▪Χινσοτοχεία (Fe, Mn, Cu, Mg, Zn, Ca, B, S)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πρωοθετί την ανάπτυξη της ρίζας σε όλους τους τύπους φυταρίων.
- Βοηθά στο ξεπέρασμα του μεταφυτευτικού σοκ και στην εξασφάλιση γρήγορης και ασφαλούς εδραίωσης στο έδαφος σε όλα τα μεταφυτεύθεντα φυτά.
- Αυξάνει τον πολλαπλασιασμό των ωφελίμων μικροοργανισμών του εδάφους οι οποίοι αυξάνουν τη βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος.
- Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και αναπληρώνει την χαρένη οργανική ουσία από την εντατική καλλιέργεια.
- Αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής ιόντων μεταξύ ριζών και εδάφους.
- Βοηθά τη διείσδυση των ριζών ακόμα και σε συμπαγή εδάφη.
- Συμβάλει στον καλύτερο αερισμό της ρίζας.
- Αυξάνει τις κυτταροδιαιρέσεις της ρίζας.
- Ενισχύει τη φυτωριακότητα των σπόρων.
- Συντελεί στη δημιουργία πολύ πάραγωγικών φυτών με μεγάλη ανθεκτικότητα σε περιόδους έντονου στρες.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Τομάτα, Μελιτάνια, Πιπεριά, Αγγούρι:

Υπαίθρια καλλιέργεια: 1 λίτρο ανά στρέμμα
Εφαρμογή: 2 λίτρα ανά στρέμμα

Εφαρμογή αμέσως μετά τη μεταφύτευση με το πρώτο πότισμα. Επαναλαμβάνουμε μετά από 3 εβδομάδες.

Καρπούζι, Πεπόνι, Λοτιά λαχανικά: Εφαρμόζουμε 1-2 ml ανά ρίζα μέσω υδρολίπανσης με σύστημα σταγόνων αμέσως μετά τη μεταφύτευση ή εναλλακτικά στη δεξαμενή με το νερό της φύτευσης σε δοσολογία 1 λίτρο ανά 250 λίτρα νερό. Επαναλαμβάνουμε μετά από 3 εβδομάδες.

Καπνός: 1 λίτρο ανά 250 λίτρα νερό. Εφαρμόζουμε κατά τη διάρκεια της φύτευσης με το μεταφυτευτικό νερό.
Επαναλαμβάνουμε σε δοσολογία 1 λίτρο/στρέμμα κατά το στάδιο της ανάπτυξης.

Πατάτα: Εμβάπτιση του παπατόσπορου σε διάλυμα αναλογίας 250 ml/100 λίτρα νερό.

Σπορεία: 150-200 ml/100 λίτρα νερό.

Φυτώρια: 1-2 λίτρα/1000 λίτρα νερό. Εφαρμόζουμε με το νερό του ποτισμάτος.

Οπωροφόρα δέντρα, Αμπέλι, Καλλωπιστικά φυτά: Κάνουμε εμβάπτιση των ριζών και των μοσχευμάτων σε διάλυμα 250-500 ml/100 λίτρα νερό για 3 λεπτά πριν τη φύτευση.

Γκαζόν: 150-200 ml/100 τετραγωνικά μέτρα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι συμβατό μόλις οι λιπαράσματα και τεχνικά προϊόντα. Ένα τετρα συνδυαστικό-τητας συστίνεται πάντοτε πριν από κάθε ανάμιξη. Δεν είναι τοξικό ακόμα κι αν υπερβούμε κατά πολύ τις συνιστώμενες δοσολογίες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύετε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγωνιά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Να μην αποθηκεύεται μετά την αραιώση του. Διατηρείστε το μακριά από παιδιά.

ANAKINEΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΙΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ



Καθ. Περιεχόμενο

4 L