

Το **BIOFERTIN-L 7-0-0** είναι ένα υγρό οργανικό λίπασμα που παρασκευάζεται από την ήπια ενζυματική υδρολύση πρωτεΐνων. Αυτή η παραγωγή διαδικασία εγγυάται τη διατήρηση των απαραίτητων αμινοξέων καθώς και ένα υψηλό ποσοστό οργανικού αάντου (>7%) προερχόμενου μόνο από τα αμινοξέα.

ΧΡΗΣΙΣ

Το **BIOFERTIN-L 7-0-0** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καλλιέργειες ως:

- ☒ Οργανικό λίπασμα αάντου για διαφυλλικούς ψεκασμούς, υδρολιπάνσεις και υδροπονικά συστήματα.
- ☒ Προσκαλλητικό/διαβρέχτης καθώς έχει υψηλό ιεζώδες με αποτέλεσμα να κολλά στα φύλλα.
- ☒ Βιοδιέγερτης ανάκαμψης μετά από περιόδους έντονου στρες από βιοτικούς και κλιματικούς παράγοντες, λόγω του υψηλού ποσοστού αμινοξέων που περιέχει.
- ☒ Διεγέρτης βελτιώσεις των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.
- ☒ Χηλικοποιητικός παράγοντας ινσοντοξείων (Fe, Zn, Mn, Cu) καθώς τα αμινοξέα βελτιώνουν την απορρόφηση των μεταλλικών μικροστοιχείων από τα φυτά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αυξάνει την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών.
- Παρέχει άνωτο άμεσα διαθέσιμο στα φυτά.
- Ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών στο στρες.
- Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των χημικών λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
- Επιταχύνει τις βιοχημικές διεργασίες που συντελούνται μέσα στο φυτό (φωτοσύνθεση, σχηματισμός σακχάρων).
- Προάγει την ανάπτυξη των καρπών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ


Διατηρήστε το προϊόν κάλεισμένο στον περίεργο. Το προϊόν δε θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μεταλλικά δοχεία. Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου ή σε δροσερό μέρος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΣΕΣ

Σε περίπτωση κατάποτης ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθέμενό μέρος του σώματος με άσφυον νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια. Χρησιμοποιείστε μέρα απομικής προστασίας (μάσκα, φόρμα, γάντια κτλ.) κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L 189) και 889/2008 (ΕΕ L 250), όπως κάθε φράφια ισχύουν.



**ΥΓΡΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
ΑΖΩΤΟΥ**
για διαφυλλικούς ψεκασμούς
και υδρολιπάνσεις σε όλες
τις καλλιέργειες

ΣΥΝΘΕΣΗ (%) β/β (%) β/ο

Αζωτο (N)	7,0	8,0
Αμινοξέα	43,0	50,0

Φυσικοχημικές Ιδιότητες
ρΗ: 5-7 Αγωγιμότητα: 9,5 dS/m
Αλατότητα: 5,5 ppt



Καθ. Περιεχόμενο

1 L

HUMOFERT



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

Ομάδα λιπασμάτων
νέου τύπου: Β'
Αρ. κυκλοφορίας: 22

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το **BIOFERTIN-L 7-0-0** μπορεί να εφαρμοστεί με διαφυλλικό ψεκασμό ή πότισμα μέσω του συστήματος άρδευσης/Πίνασης σύμφωνα με τις ακολουθές δοσολογίες. Για την παρασκευή του διαλύματος εφαρμογής, διαλύεται η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος στα 3/4 του όγκου του νερού με ταυτόχρονη ανδεσμεύση και στη συνέχεια γίνεται συμπλήρωση με νερό μέχρι το τελικό όγκο του διαλύματος.

Διαφυλλικός ψεκασμός: 500-700 ml/στρέμμα αραιώμενο σε 50-200 L νερό

Υδρολίπανση: 1-3,5 L/στρέμμα

Υδροπονία: 1-2,5 L/500 L νερό

Προσκαλλητική δράση: 300-500 ml/100 L νερό

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Φράουλες: Κάθε 10-15 ημέρες από την έναρξη της ανάπτυξης έως τη συγκομιδή.

Καρποτεικά λαχανικά (τομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκύνη, κ.α.): Κάθε 8-12 ημέρες από τη μεταφύτευση έως τα μέσα της συγκομιδής.

Φυλλώδη λαχανικά: Κάθε 7-10 ημέρες αρχίζοντας από την εμφάνιση των πρώτων πραγματικών φύλλων.

Κηπευτικά (κρατούζι, πεπόνι, κ.α.): Κάθε 7-12 ημέρες ξεκινώντας μετά τη συγκομιδή.

Πατάτα: Κάθε 10-14 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο σχηματισμού του κονδύλου έως την έναρξη της ανθήσης.

Καρότο, Κρεμμύδι, Παντζάρι: Κάθε 10-15 ημέρες ξεκινώντας από τη 2η-3η εβδομάδα μετά την ανάδυση και έως τη μεγέθυνση της ρίζας.

Δέντρα (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, ελιές, κ.α.): Κάθε 10-15 ημέρες ξεκινώντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως την αρχή της ωρίμανσης.

Αμπέλο, Ακτινίδιο: Κάθε 10-15 ημέρες αρχίζοντας από το στάδιο πριν την ανθοφορία έως την αρχή της ωρίμανσης.

Καλωπιστικά φυτά, Δάσικά δενδρύλλια: Κάθε 7-12 ημέρες από τη μεταφύτευση και μετά.

Λουκόδια: Κάθε 8-12 ημέρες από τη μεταφύτευση έως το μένιστο της συγκομιδής.

Γκαζόν, Αστικό πράσινο: Κάθε 10-15 ημέρες.

Δημητριακά: Στο στάδιο των 10-20 εκατοστών.

Χορτονύμες: Κάθε 8-12 ημέρες αρχίζοντας νωρίς την άνοιξη και επαναλαμβάνοντας μετά από κάθε κόψιμο.

Βαμβάκι: Στην αρχή της άνθησης και 7-12 ημέρες αργότερα.

Καλαμπόκι: Στο στάδιο των 15-20 εκατοστών, στο στάδιο των 25-35 εκατοστών και πριν το σχηματισμό του θυσάνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να εφαρμόζεται τις δοσησερές ώρες της ημέρας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδύαζεται με όλα σχέδιον τα λιπασμάτα και χημικά παρασκευάσματα. Όλες οι υδατοδιάλευκτές σκόνες να ανανεώνονται με το **BIOFERTIN-L 7-0-0** μετά από προδιάλυση. Ακολουθήστε τις οδηγίες των παρασκευαστών φυτοφαρμάκων πριν τα αναμίξετε με το **BIOFERTIN-L 7-0-0**. Κάθε περίπτωση προστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας πριν την ανάμιξη στο βιτό.

