

Το **STRONG-26** είναι ένας υγρός συμπτυκνωμένος φυσικός ενεργοποιητής ο οποίος περιέχει 26% χουμικά και φουλβικά οξέα. Σχηματίζεται από φυσικά, προερχόμενα από φυτά, κοιτάσματα καφέ άνθρακα και είναι πλούσιο σε μακρο και μικρο θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία (K, N, Ca, Mg, Fe, S, Mn, Zn, Cu, B, Mo, K.a.).

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **STRONG-26** αυξάνει την ευφορία του εδάφους με τους ακόλουθους τρόπους:

- Αυξάνοντας την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και την ικανότητα συγκράτησης του νερού.
- Προάγοντας την ανάπτυξης καλής δομής στο έδαφος.
- Βελτιώνοντας τη συγκράτηση και την αφομοίωση από το φυτό των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων μειώνοντας με τον τρόπο αυτό την απώλεια των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων λόγω απόπλυσης και διαρροής,
- Σταθεροποιώντας το έδαφος ενάντια στην αυξημένη οξύτητα από τις συχνές εφαρμογές λιπασμάτων.
- Διεγείροντας τη ριζέλιμη μικροβιακή δράση και την ανάπτυξη της ωφέ.
- Προάγοντας τη λήψη των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά στην υδροπονική παραγωγή.
- Οξυγονώνοντας καλύτερα το ριζικό σύστημα και αποτρέποντας πιθανά σαπίσματα.
- Πρωθώνοντας την είσοδο και τη συγκράτηση του ασβεστίου στο έδαφος.
- Μετακινώντας το αλουμίνιο στο υπέδαφος.

ΟΦΕΛΗ

Το **STRONG-26** αυξάνει την αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων που εφαρμόζονται ενώ ταυτόχρονα διεγείρει την ανάπτυξη του φυτού και βελτιώνει τη δομή του εδάφους αυξάνοντας την απόδοση της καλλιέργειας. Επιπλέον βελτιώνει την ποιότητα των καρπών προσδίδοντάς τους μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, εντονότερα χρώματα και περισσότερο σάκχαρα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος μακριά από παγωνιά, υψηλές θερμοκρασίες και έντονο φως. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Συμπτυκνωμένος Φυσικός Ενεργοποιητής & Οργανικό Λίπασμα



ΝΡΚ 0 - 0 - 5

ΣΥΝΘΕΣΗ (β/β)

Χουμικά & Φουλβικά οξέα	26,0%
Οργανικός Άνθρακας (C)	10,5%
Άζωτο (N)	0,1%
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	0,06%
Κάλιο (K ₂ O)	5,0%
Ασβέστιο (CaO)	0,03%
Μαγνήσιο (MgO)	0,03%
Ιχνοστοιχεία (Fe, Zn, Mn, S, Cu, B, Mo, Co)	
pH	10,5 - 11,0



Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Γ
Αριθμός κυκλοφορίας: 23



ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 - Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

Καθ. Περιεχόμενο

1 L

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **STRONG-26** εφαρμόζεται κυρίως από στο έδαφος μέσω οποιοδήποτε συστήματος λίπανσης-άρδευσης. Όπου δεν είναι εφικτό μπορεί να εφαρμοστεί με διαφυλλικό ψεκασμό.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κητευτικά (τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα, κολοκύθι, πεπόνι, καρπούζι), Φράουλα: Υδρολίπανση με 0,5-1 L/στρέμμα. 1η εφαρμογή μετά τη μεταφύτευση και στη συνέχεια επανάληψη κάθε 15 ημέρες μέχρι την ολοκλήρωση της συγκομιδής.

Λαχανικά (Μαρούλι, Σπανάκι, Σέλινο, Φασόλι, Άλλα πράσινα λαχανικά), Κρεμμύδι, Καρότο, Πατάτα: Υδρολίπανση με 0,4-1 L/στρέμμα. 1η εφαρμογή μετά τη φύτευση ή μεταφύτευση και στη συνέχεια επανάληψη κάθε 15 ημέρες μέχρι τη συγκομιδή.

Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Άλλα δέντρα: Υδρολίπανση με 0,5-1 L/στρέμμα. Εφαρμόζουμε κατά την ανθοφορία, όταν ο καρπός αρχίζει να ωριμάζει και κατά την αύξηση του μεγέθους του καρπού.

Εσπεριδοειδή: Υδρολίπανση με 0,5-1 L/στρέμμα. Εφαρμόζουμε χωρίς την Άνοιξη, στα μέσα του Καλοκαιριού και στο τέλος του Καλοκαιριού (για όψιμες ποικιλίες).

Ελιά: Υδρολίπανση με 0,3-0,5 L/στρέμμα. Εφαρμόζουμε την Άνοιξη και το Φθινόπωρο (όταν το κουκούτσι σκληραίνει). Ενεργοποιεί το μεταβολισμό του δέντρου και αυξάνει την απόδοση λαδιού της ελιάς.

Αμπέλι, Ακτινίδιο: Υδρολίπανση με 0,3-0,5 L/στρέμμα. Εφαρμόζουμε πριν την ανθοφορία, μετά την ανθοφορία και όταν ο καρπός αρχίζει να ωριμάζει.

Ανθοφόρα, Καλλωπιστικά φυτά: Εφαρμόζουμε με υδρολίπανση 1,5-3 L/στρέμμα σε όλη την καλλιεργητική περίοδο. Διαιρέστε τη συνολική δοσολογία σε εβδομαδιαίες εφαρμογές.

Δημητριακά, Καλαμπόκι, Βαμβάκι: Όπου είναι εφικτό εφαρμόζουμε με υδρολίπανση σε δοσολογία 0,5-1 L/στρέμμα. Εναλλακτικά εφαρμόζουμε διαφυλλικά. 1η εφαρμογή μόλις εμφανιστεί το φυτό. 2η εφαρμογή πριν την ανθοφορία.

Μοσχεύματα, Βλαστάρια, Φυτάρια: Εμβάπτιση πριν τη φύτευση σε διάλυμα αραιώσεως 1:50.

Διαφυλλική εφαρμογή: 1 L ανά 200-700 L νερό

Υδροπονία: 0,5-1 L ανά στρέμμα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Να εφαρμόζεται διαφυλλικά μόνο τις δροσερές ώρες της ημέρας. Σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών να αποφεύγονται οι διαφυλλικοί ψεκασμοί.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν συνδυάζεται με ζιανιοκτόνα επαφής και με ελαιούχα ή πολύ όξινα σκευάσματα.

