

Το **GROWER 30-0-0** είναι ένα υγρό λίπασμα βραδείας αποδόσεως αζώτου. Προέρχεται από τον συνδυασμό υδατοδιαλυτής πολυμεθυλενικής ουρίας με μικρά ποσοστά ελεύθερης ουρίας και αποτελεί μια πολύ συμπυκνωμένη πηγή υγρού αζώτου.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Αποτελεί μία πολύ σταθερή και συνεχή πηγή παροχής αζώτου που μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες αζωτούχου λίπανσης σε όλες τις καλλιέργειες.
- Αποδεσμεύει σταδιακά το άζωτο σε 8-12 εβδομάδες ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και UV ακτινοβολίας.
- Αυξάνει τη μικροβιακή δράση στο έδαφος η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την αποδόσευση του αζώτου και την αφομοίωσή του από τις ρίζες των φυτών.
- Δεν εξατμίζεται και δεν ξεπλένεται λόγω της μορφής αζώτου που περιέχει.
- Είναι ιδανικό για οποιοδήποτε σύστημα λίπανσης καθώς δεν δημιουργεί προβλήματα φραξίματος και τριβών.
- Έχει προσκολλητικές ιδιότητες.
- Έχει πολύ χαμηλό δείκτη φυτοτοξικότητας.
- Δεν προξενεί εγκαύματα.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα λιπάσματα και χημικά παρασκευάσματα. Το **GROWER 30-0-0** θα πρέπει να μπαίνει πάντα πρώτο στο διάλυμα. Να γίνεται πάντα ουδετεροποίηση των πολύ όξινων διαλυμάτων πριν την ανάμιξή τους με το **GROWER 30-0-0**. Όλες οι υδατοδιαλυτές σκόνες θα πρέπει να αναμιγνύονται με το **GROWER 30-0-0** αφού πρώτα διαλυθούν στο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να μην χρησιμοποιείται όταν η καλλιέργεια βρίσκεται κάτω από συνθήκες έντονου στρες από έντομα, ζέστη ή ανεπαρκή επίπεδα υγρασίας. Να εφαρμόζεται τις δροσερές ώρες της ημέρας. Μην αφήνετε συμπυκνωμένο σπρέι να πέφτει πάνω στον καρπό ή στα φύλλα.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΕΛΑΦΡΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΜΕΥΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ

GROWER

30 - 0 - 0

Άζωτο βραδείας
αποδόσευσης
85%

ΣΥΝΘΕΣΗ
Άζωτο (N) 30% β/β
(38% β/ο)



Αποκλειστική Διάθεση

HUMOFERT



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου,
144 52 Μεταμόρφωση
Web Site: www.humofert.gr

Λίπασμα Ε.Κ.

Καθ. Περιεχόμενο

1 L

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Εφαρμόζεται διαφυλλικά με ψεκασμό καθώς και στο έδαφος μέσω του συστήματος άρδευσης/λίπανσης (υδρολίπανση).

Διαφυλλικές Εφαρμογές

Αραιώνουμε σε αναλογία 1:50 - 1:400 ανάλογα με την καλλιέργεια και τον τύπο του εξοπλισμού ψεκασμού και εφαρμόζουμε 3-4 φορές κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου στις πιο κάτω δοσολογίες:

Κηπευτικά, Λαχανικά (τομάτα, πιπεριά, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, μαρούλι, σπανάκι, μπρόκολο, κουνουπίδι, φασόλι, αρακάς κτλ.): 0,4-0,6 L/στρέμμα.

Φράουλα: 0,2-0,6 L/στρέμμα.

Πατάτα, Κρεμμύδι, και άλλες ριζώδεις, βολβώδεις και κονδυλώδεις καλλιέργειες: 0,2-0,4 L/στρέμμα.

Αμύγδαλο, Καρύδι και άλλα ακρόδρυα: 0,2-0,4 L/στρέμμα.

Δαμάσκηνο, Νεκταρίνι, Ροδάκινο: 0,3-0,8 L/στρέμμα.

Μήλο, Αχλάδι και άλλες σαρκώσεις καλλιέργειες: 0,2-0,3 L/στρέμμα.

Ακτινίδιο: 0,3-0,8 L/στρέμμα.

Εσπεριδοειδή: 0,3-0,8 L/στρέμμα.

Ελιά: 0,3-0,8 L/στρέμμα.

Αμπέλι: 0,3-0,5 L/στρέμμα.

Καλαμπόκι, Γλυκό καλαμπόκι: 0,15-0,25 L/στρέμμα.

Σιτάρι, Κριθάρι, Σόργο: 0,2-0,8 L/στρέμμα.

Εδαφικές Εφαρμογές

Εφαρμόζουμε κάθε 15-30 ημέρες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου στις ακόλουθες δοσολογίες:

Κηπευτικά, Λαχανικά (τομάτα, πιπεριά, αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, μαρούλι, σπανάκι, μπρόκολο, κουνουπίδι, φασόλι, αρακάς κτλ.): 2,5-4,5 L/στρέμμα.

Φράουλα: 2,5-4,5 L/στρέμμα.

Πατάτα, Κρεμμύδι, και άλλες ριζώδεις, βολβώδεις και κονδυλώδεις καλλιέργειες: 2,5-4,5 L/στρέμμα.

Αμύγδαλο, Καρύδι και άλλα ακρόδρυα: 4,5 L/στρέμμα.

Δαμάσκηνο, Νεκταρίνι, Ροδάκινο: 4,5 L/στρέμμα.

Μήλο, Αχλάδι και άλλες σαρκώσεις καλλιέργειες: 4,5 L/στρέμμα.

Ακτινίδιο: 4,5 L/στρέμμα.

Εσπεριδοειδή: 4,5 L/στρέμμα.

Ελιά: 4,5 L/στρέμμα.

Αμπέλι: 2,5-4,5 L/στρέμμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Διατηρήστε το καλά σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη συσκευασία του. Προστατέψτε το από παγωνιά και ηλιακή ακτινοβολία. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά την χρήση. Είναι επιβλαβές εάν καταποθεί. Διατηρήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

