

To GROWER 8-32-5 είναι ένα λίπασμα με υψηλό ποσοστό Φωσφόρου ίδιαντο για νεαρά φυτά, φυτώρια και νεόσπαρτα χωράφια. Το **GROWER 8-32-5** προέρχεται από τις πιο υψηλής ποιότητας πηγές Αζώτου, Φωσφόρου και Καλίου ενώ το 50% του Αζώτου που περιέχει είναι βραδείας αποδέσμευσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το συμπυκνωμένο λίπασμα **GROWER 8-32-5** δρα στη θρέψη των φυτών με τους ακόλουθους τρόπους :

- Εξασφαλίζει καλό ριζικό σύστημα στα φυτά.
- Εμποδίζει την απότομη ανάπτυξη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της ευπάθειας των φυτών.
- Παρέχει μια σταθερή και συνεχόμενη πηγή αζώτου στα φυτά επιπτυχάνοντας την σταδιακή ομαλή ανάπτυξή τους.
- Ο Φώσφορος και το Κάλι είναι πλήρως διαλυτά και για το λόγο αυτό άμεσα διαθέσιμα στα φυτά.
- Δεν περιέχει άλατα και χλώρια και γι' αυτό είναι ιδιαίτορο για ευαίσθητα φυτά.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συνδυάζεται με όλα σχεδόν τα λιπάσματα και χημικά παρασκευάσματα. Το **GROWER 8-32-5** θα πρέπει να μπαίνει πάντα πρώτο στο διάλυμα. Πριν την ανάμειξη στο βυτίο να γίνεται πάντα ένα τεστ συνδυαστικότητας. Η παρακάτω σειρά ανάμειξης θα πρέπει πάντα να ακολουθείται μετά την διάλυση του **GROWER 8-32-5**:

1. Διαβρέχτες 2.
2. Υγρά διαλύματα 3.
3. Υδατοδιαλυτές σκόνες 4.
4. Γαλακτοποιητές.

Χρησιμοποιήστε όλη τη δεξαμενή την ίδια μέρα.

ΥΓΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

GROWER 8 - 32 - 5

Περιέχει Ιχνοστοιχεία,
Αμινοξέα, Φυσικούς
Αναπτυξιακούς Παράγοντες
και άλλα μικροστοιχεία. Το
50% του Αζώτου είναι
βραδείας αποδέσμευσης.

ΣΥΝΘΕΣΗ

N	8% wt/wt
P ₂ O ₅	32% wt/wt
K ₂ O	5% wt/wt



HUMOFERT



ΕΡΜΟΥ 1 & ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ
144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗλ. 210 284 5891 - FAX. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr

4 lt

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Εδαφικές Εφαρμογές
Τούματα, Πιπεριά: 0,5-0,75 λίτρα/στρέμμα από το στάδιο της προανθοφορίας και κάθε 10-14 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργικής πριόδου.

Αγγούρι, Κολοκύθι,
Καρπούζι : 0,25-0,5 λίτρα/στρέμμα 1-2 εβδομάδες μετά την μεταφύτευση.

Πεπόνι: 0,5-0,75 λίτρα/στρέμμα από το στάδιο της προανθοφορίας και 2-3 πρόσδομές εφαρμογές κάθε 2 εβδομάδες.

Λοιπά Λαχανικά: 0,5-0,75 λίτρα/στρέμμα κάθε 2 εβδομάδες μετά την αραίωση ή όταν τα φυτά έχουν ριζώσει καλά.

Διαφυλλικές Εφαρμογές
Γενικά εφαρμόζουμε σε δοσολογία 1,5 φορές μεγαλύτερη από αυτή των εδαφικών εφαρμογών. Οι διαφυλλικοί φεκαριοί θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να μη χρησιμοποιείται σταν η καλλιέργειες βρίσκεται κάτω από συνθήκες έντονου στρες από έντομα, ζέστη ή ανεπαρκή επίπεδα υγρασίας. Να εφαρμόζεται τις δροσερές ώρες της ημέρας. Μην αφήνετε συμπυκνωμένο στρέι να πέφτει πάνω στον καρπό ή στα φύλλα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Διατηρήστε το μακριά από παιδιά. Είναι επιβλαβές εάν καταπίνεται. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Πλύνετε πολύ καλά κάθε εκτεθειμένο μέρος του σώματος με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή για τα μάτια.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΕΛΑΦΡΩΣ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ