

Το Proton-P είναι ένα οργανικό φυσικό λίπασμα σε μορφή υδατοδιαλυτής σκόνης, το οποίο προέρχεται από θαλάσσια φύκια του γένους *Ascophyllum nodosum*. Λόγω του τρόπου παραγωγής του το Proton-P διατηρεί όλο το θρεπτικό περιεχόμενο των φυκιών, το οποίο περιλαμβάνει φυσικές φυτορμόνες (κιτοκινίνες, αυξίνες, γιβιθερελλίνες, μπεταΐνες), αμινοξέα και υδατάνθρακες.

Εφαρμόζοντας το Proton-P σύμφωνα με την προτεινόμενη δοσολογία και το συστηνόμενο πρόγραμμα εφαρμογών ανά καλλιέργεια επιτυγχάνουμε:

- Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των καλλιεργειών.
- Αύξηση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.
- Προώθηση της ανάπτυξης.
- Βελτίωση της ποιότητας της συγκομιδής (αύξηση σακχάρων, ιχνοστοιχείων και πρωτεΐνων).
- Επιμήκυνση του χρόνου ζωής των νωπών καρπών στο ράφι (shelflife).
- Ενίσχυση του ριζικού συστήματος των φυτών.

**Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: ΣΤ'**

- Μεγαλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες και τα φύλλα.
- Αύξηση του πληθυσμού των αφέλιμων μικροοργανισμών του εδάφους.
- Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυτών σε βιοτικούς παράγοντες.
- Μεγαλύτερη αντοχή σε στρες προερχόμενο από περιβαλλοντικούς παράγοντες (παγετό και ξηρασία).
- Υψηλότερη φυτρωτικότητα των σπόρων.
- Αύξηση των κερδών του καλλιεργητή.

#### ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ

Το Proton-P εφαρμόζεται στις ακόλουθες δοσολογίες ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής:

Διαφυλλικά: 25-50 γρ./100 lt νερό

Υδρολίπανση: 150-250 γρ./στρέμμα


Σπορεία: 50-75 γρ./100 lt νερό

Εμβάπτιση απόρων: 50 -75 γρ. / 50 lt νερό  
(Αφήστε το σπόρο να στεγνώσει καλά)

Εμβάπτιση ριζών: 50 -75 γρ. / 50 lt νερό κατά τη μεταφύτευση.

**Αρ. κυκλ. νέου τύπου λιπάσματος : 24**


# Proton-P



Κατάλληλο για βιολογικές καλλιέργειες

#### ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

#### Αποκλειστική Διάθεση



Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, 144 52 Μεταμόρφωση  
Τηλ. 210 284 5891, 210 285 5061 Fax. 210 281 7971  
E-mail: info@humofert.gr Web Site: www.humofert.gr

#### ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

##### ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αγγούρι, Φασόλι : Εφαρμόζουμε στα πρώτα 4

Δέντρα : Εφαρμόζουμε πριν την άνθηση, μετά την άνθηση και κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης έως 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή. Μια εφαρμογή μετά

συγκομιδή.

Πατάτα : Αρχικά κάνουμε εμβάπτιση των

κονδύλων για 24 ώρες και στη συνέχεια εφαρμόζουμε σε ανάπτυξη 15-20 εκ., πριν την ανθοφορία και κατά την ανθοφορία.

Αμπέλι : Εφαρμόζουμε στο στάδιο της βλαστικής

ανάπτυξης, του δεσμάτος καρπού και της μεγέθυνσης τσαμπιού και καρπού. Μια εφαρμογή μετά τη συγκομιδή αυξάνει την παραγωγικότητα

ανάπτυξης.

Καπνός, Τεύτλα : 3-4 εφαρμογές κάθε 10-20 μέρες

αρχίζοντας από το στάδιο των πρώτων φύλλων.

Φράουλα : Εφαρμόζουμε αρχικά όταν υπάρχει

αρχική φυλλωσιά για να απορροφήσει το φέκασμα, στην πρώτη ανθοφορία, στο δέσιμο των καρπών και κάθε 2-3 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.

Φυλλώδη λαχανικά : Εφαρμόζουμε 3-4 φορές από

το στάδιο των πρώτων πραγματικών φύλλων ως

τη συγκομιδή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε το προϊόν σε δροσερό μέρος μακριά από άμεση επαφή με το φως του ήλιου.

Διατηρήστε το καλά κλεισμένο στον περιέκτη.

κάθε συγκομιδή.

**ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

