

Λίπασμα Αζώτου-Βορίου σε υδατοδιαλυτή σκόνη

D i a - B

bio
Κατάλληλο
για βιολογικές
καλλιέργειες

Για τη διόρθωση τροφοτενιών Βορίου
σε όλες τις καλλιέργειες

3 - 0 - 0 + 17B

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πλήρη κάλυψη των αναγκών των φυτών σε βόριο και ταχεία εξάλειψη εμφανιζόμενων τροφοτενιών Βορίου.
- Αύξηση του άμεσα διαθέσιμου στα φυτά αζώτου στα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξής τους.
- Αύξηση της καρποδετικής ικανότητας των φυτών.
- Επιτάχυνση των βιοχημικών διεργασιών που συντελούνται μέσα στα φυτά (σχηματισμός σακχάρων, φωτοσύνθεση).
- Υψηλή απορροφητικότητα βορίου λόγω των αμινοξέων που περιέχονται στο προϊόν.
- Μεγαλύτερη προσληπτικότητα βορίου από το φύλλωμα εξαιτίας των προσκολλητικών ιδιοτήτων του σκευάσματος.

ΑΝΑΜΙΞΗ: Συστήνεται προδιάλυση του προϊόντος πριν την ανάμιξή του στη δεξαμενή εφαρμογής. Εναλλακτικά προτείνεται η σταδιακή διάλυση του προϊόντος στο βυτίο με διαρκή ανάδευση για ευκολότερη μεταχείριση και αποφυγή συσσωματώσεων. Να εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατό μετά τη διάλυση.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ: Το Dia-B είναι κατάλληλο για εφαρμογές από εδάφους μέσα από συστήματα άρδευσης-λίπανσης καθώς και με διαφυλλικούς ψεκασμούς. Η ποσότητα εφαρμογής καθορίζεται από την ένταση της τροφοπενίας βορίου, το είδος της καλλιέργειας, το μέγεθός της και τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Εδαφική Εφαρμογή: Εφαρμόζουμε σύμφωνα με τις ανάγκες βορίου της καλλιέργειας ως ακολούθως:



α) Μεγάλη ανάγκη βορίου: 0,5-1,5 kg/ στρέμμα

β) Μέτρια ανάγκη βορίου: 250-500 g/ στρέμμα

γ) Μικρή ανάγκη βορίου: 100-250 g/ στρέμμα

Διαφυλλική Εφαρμογή: Εφαρμόζουμε όταν η καλλιέργεια έχει αναπτύξει αρκετό φύλλωμα ώστε να μπορεί να απορροφήσει το σπρέι. Όπου είναι εφικτό, πρέπει να χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες νερού, καθώς πολλές από τις ευαίσθητες καλλιέργειες έχουν κηρώδη φύλλα που είναι δύσκολο να διαβρεχθούν. Να μην εφαρμόζεται όταν το φως του ήλιου είναι έντονο και η θερμοκρασία μεγαλύτερη από 24°C.

Τεύτλα: 600 g/στρέμμα σε τουλάχιστον 50L νερό/στρέμμα.

Λαχανικά: 600 g/στρέμμα σε τουλάχιστον 50L νερό/στρέμμα.

Ελιά: 600 g/στρέμμα σε 100L νερό/στρέμμα.

Μήλα: 3 εφαρμογές σε διαστήματα 14-21 ημερών η μία από την άλλη με

δοσολογία 250 g/στρέμμα σε τουλάχιστον 100L νερό/στρέμμα.

Γενικά, μια δοσολογία 600 g/στρέμμα είναι ικανοποιητική για τις περισσότερες

καλλιέργειες που παρουσιάζουν τροφοτενία βορίου. Όταν η

τροφοτενία είναι έντονη, η δόση μπορεί να αυξηθεί έως το 1,25

kg/στρέμμα. Μην εφαρμόζετε πο-τέ περισσότερο από 1,25

κιλό/ στρέμμα με μία μόνο εφαρμογή. Εάν η καλλιέργεια

χρειάζεται περισσότερο από 1,25 κιλό/στρέμμα διαιρέστε τη

συνολική ποσότητα σε 2-3

δόσεις εφαρμόζοντας κάθε 14

μέρες.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με τα περισσότερα

μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα και υγρά

λίπασματα. Όλες οι υδατοδιαλυτές

σκόνης να αναμνύονται με το Dia-B

μετά από προδιάλυση. Σε κάθε περίπτωση

συστήνεται ένα τεστ συνδυαστικότητας

πριν την ανάμιξη στο βυτίο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατηρήστε το καλά

σφραγισμένο και αποθηκευμένο στη

συσκευασία του. Προστατέψτε το από την

παγωνιά.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (% β/β)

Βόριο (B) 17,0

Αζωτο (N) 3,0

Οργανικό N 3,0

Αμινοξέα 18,8

pH: 8,26 Αγωγιμότητα: 16,4 mS/cm
Αλατότητα: 9,6 ppt

Ομάδα λίπασμάτων νέου τύπου: B'
Αρ. κυκλοφορίας: 22

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ

HUMOFERT 

Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου,
144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 284 5891 Fax. 210 281 7971
E-mail: info@humofert.gr
Web Site: www.humofert.gr

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H360FD : Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (θα προσδιοριστεί).

Περιέχει: Disodium Octaborate Tetrahydrate

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Δηλώσεις Επικινδυνότητας

H360FD : Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Δηλώσεις Προφύλαξης

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε... σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς (θα προσδιοριστεί).

Περιέχει: Disodium Octaborate Tetrahydrate

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ