

5 - 3 - 2

Αζωτο (N)	5,0 %
Οργανικό N	5,0 %
Φώσφορος (P ₂ O ₅)	3,0 %
Κάλιο (K ₂ O)	2,0 %
Ασβέστιο (CaO)	7,0 %
Μαγνήσιο (MgO)	1,0 %
Θείο (S)	4,7 %
Οργανικός Άνθρακας (C)	27 %
Οργανική ουσία	46 %
Αμινοξέα & Πρωτεΐνες	31 %
Χουμικά & Φουλβικά οξέα	13 %
Υγρασία	11 %
C/N	5,4

Οργανικό λίπασμα / απαγορεύεται η πρόσβαση εκτρεφόμενων ζώων στην έκταση τουλάχιστον για 21 ημέρες μετά τη διασπορά του στο έδαφος.

bio

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 (ΕΕ L189) και 889/2008 (ΕΕ L250), όπως κάθε φορά ισχύουν

Παράγεται στην Ιταλία από την Grena s.r.l.
(Approval Number : APB58UFERT2)
για λογαριασμό της HUMOFERT S.A.

Συνθήκες Αποθήκευσης: Πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένα δοχεία, σε θερμοκρασία δωματίου, σε ξηρό μέρος χωρίς υγρασία, προστατευμένο από βροχή, πάγο και υψηλές θερμοκρασίες.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Όπωροφόρα δέντρα	60-80 kg/στρέμμα	Από τέλη Καλοκαιριού έως τέλη Άνοιξης
Αμπέλι	80-120 kg/στρέμμα	Φθινόπωρο-Χειμώνα
Εσπεριδοειδή	80-120 kg/στρέμμα	Φθινόπωρο-Χειμώνα
Ελιά	60-100 kg/στρέμμα	Από τέλη Καλοκαιριού έως τέλη Άνοιξης
Κηπευτικά (υπαίθρια και θερμοκηπίου)	70-100 kg/στρέμμα	Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του εδάφους
Τεύτλα, Πατάτες Σπαράγγια, Καρότα	40-60 kg/στρέμμα	Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του εδάφους
Καλαμπόκι, Καπνός, Ρύζι, Ήλιανθος, Δημητριακά	50-80 kg/στρέμμα	Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του εδάφους

Αρ. Παρτίδας:

Ημ. Παραγωγής:

Ομάδα λιπασμάτων νέου τύπου: Γ

Αρ. κυκλοφορίας: 23



5 212024 508263